

NL

FR [cliquez ici](#)

EN [click here](#)



PERMANENTE MAKE-UP & TATOEAGES VERWIJDEREN - INFORMATIE & TOESTEMMING

Voornaam:	Achternaam:
Adres:	Postcode:
Geboortedatum:	Telefoonnr.:
E-mail;	

PROBLEMEN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN TIJDENS EN NA HET VERWIJDEREN VAN PMU, SPMU EN TATOEAGES MET DE LASER.

De mogelijke risico's van de procedure:

- Pijn, purpura, zwelling, roodheid, blauwe plekken, blaarvorming, korstvorming, ingegroeide haren, infectie en onvoorziene complicaties die vele maanden, jaren of permanent kunnen duren.
- Veel van de cosmetische tatoeages en lichaamstatoeages worden gemaakt met ijzeroxidepigmenten. Ijzeroxide kan roodbruin of zwart worden. Titaanoxide en andere pigmenten kunnen ook zwart of wit worden.
- Soms is het niet mogelijk de zwarte of witte inkten te verwijderen en moet de behandeling gestaakt worden.

Risico's die onmiddellijk kunnen voorkomen:

Kortetermijneffecten kunnen onder meer zijn:

- Roodheid, een licht branderig gevoel, tijdelijke blauwe plekken of blaarvorming.
- De huid kan bruinachtig/rood worden (bekend als hyperpigmentatie) of lichter (bekend als hypopigmentatie). Dit verdwijnt meestal binnen enkele weken, maar het kan 3-6 maanden duren voordat het genezen is.
- Permanente kleurverandering en littekenvorming is een zeldzaam risico maar kan wel voorkomen. Verlies van sproeten of gepigmenteerde laesies kan optreden.
- Haaruitval op de behandelingsplaats kan voorkomen en is van voorbijgaande aard.
- Bij sommige patiënten zijn oppervlakkige erosies, bloeditstoringen, blaarvorming, kleine witte puntjes, roodheid en zwelling waarneembaar, die maanden, jaren of permanent kunnen aanhouden.
- Bloedingen: puntbloedingen zijn zeldzaam, maar kunnen optreden na behandelingsprocedures.

Allergische reacties:

- Er zijn meldingen geweest van overgevoeligheid voor de verschillende tatoeagepigmenten tijdens en na het verwijderingsproces.
- Wanneer men lasert op de tatoeage dan breekt men de inkten in duizend stukjes zodat deze door het lichaam kunnen geëlimineerd worden. In enkele gevallen kan men een reactie doen op de afbraak van deze inkten, vooral als het tatoeagepigment kwik, kobalt of chroom bevat.
- Bij verspreiding kunnen de pigmenten een ernstige allergische reactie veroorzaken die bij elke opeenvolgende behandeling kan optreden.

Kans op Infectie:

- Hoewel infectie na behandeling weinig voorkomt, kunnen bacteriële, schimmel- en virale infecties optreden. Herpes simplex virus infecties rond de mond kunnen optreden na behandeling.
- Dit geldt voor zowel personen met een voorgeschiedenis van herpes simplex virusinfecties en personen zonder bekende voorgeschiedenis van herpes simplex virusinfecties in het mondgebied.
- Als een huidinfectie optreedt, kunnen aanvullende behandelingen nodig zijn.

Ik bevestig hierbij ook dat wanneer ik deze zaken opmerk ik onmiddellijk contact opneem met Sarasin Clinic.

Risico's op lange termijn:

- Er is een risico op littekenvorming, hyper- en hypopigmentatie.
- Soms zal de arts of verpleegkundige ervoor opteren om te tatoeage niet volledig te verwijderen wanneer er een te grote kans is op bovenstaande complicaties. Niettemin is de kans bij elke behandeling reëel dat men hyper- en hypopigmentatie stoornissen kan krijgen alsook de vorming van littekens.
- Kleurverandering en textuele verandering in de huid kan optreden.

Nazorg:

- Naleving van de nazorgrichtlijnen is van cruciaal belang voor de genezing, het voorkomen van littekenvorming en hyperpigmentatie.
- Richtlijnen voor de nazorg zijn onder andere het vermijden van de zon gedurende 2 maanden na de ingreep!
- Als het toch nodig is om in de zon te gaan, moet een zonnebrandcrème met SPF 25 of hoger worden gebruikt.
- De eerste week na de behandeling mag men niet in de sauna / zwembad en is het aangewezen om 2 x daags Flamigel te smeren en af te dekken met een occlusief verband.
- Korstjes kunnen voorkomen en mogen niet verwijderd worden.

Ik begrijp dat meerdere behandelingen nodig zullen zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

- Wij bieden geen garantie op volledige verwijdering van de tatoeages.
- Wij behouden ons het recht om de behandeling ten alle tijde te staken wanneer wij vermoedens hebben van het niet correct naleven van de nazorg. Of wanneer het verwachtingspatroon van de klant niet realistisch is.
- Wij kunnen geen 100% zekerheid geven over de resultaten die kunnen worden verkregen. Volledige tatoeageverwijdering is niet altijd mogelijk aangezien tatoeages bedoeld waren om permanent te zijn en veel ook afhangt van de gekozen inkten en de diepte waarin de tatoeage gezet werd.

BEVESTIGING

Mijn vragen over de procedure zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp de procedure en aanvaard de risico's. Ik onthef de dienstverlener hierbij van alle aansprakelijkheid in verband met de hierboven vermelde procedure.



GELIEVE ALLE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

Heeft u één van de volgende aandoeningen of heeft u die gehad in de afgelopen 12 maanden?

Gebruikt u voorgeschreven medicatie?

Indien ja, gelieve de gebruikte geneesmiddelen te vermelden.

	JA	NEE	GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN
Diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hemofilie / Bevingen / Epilepsie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zwangerschap / Borstvoeding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ontsteking of infectie van de huid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebrek aan normaal huidgevoel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krijgt u makkelijk littekens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contact dermatitis of een andere huidziekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lijdt u aan een hartkwaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruikt u een pacemaker of een soortgelijk apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Latex allergie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Koortslip / Herpex Simplex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HIV / AIDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auto-Immuunziekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Histamine reactie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vermeld eventuele allergieën die u heeft:

In geval van zwangerschap of borstvoeding voeren wij geen behandeling uit.

Ik bevestig dat de bovenstaande verklaringen waar zijn.

Ik beloof om de kliniek te informeren als een van de bovenstaande informatie verandert tijdens de behandelingen.

naam + voornaam patiënt

handtekening patiënt

datum





ENLEVER DU MAQUILLAGE PERMANENT & LES TATOUAGES - CONSENTEMENT ECLAIRÉ

Prénom :	Nom de famille :
Adresse :	Code postal :
Date de naissance :	téléphone :
E-mail :	

LES PROBLÈMES QUI PEUVENT SURVENIR PENDANT ET APRÈS L'ÉLIMINATION AU LASER DU MAQUILLAGE PERMANENT ET DES TATOUAGES.

Les risques potentiels de la procédure :

- Douleur, purpura, gonflement, rougeur, ecchymoses, cloques, croûtes, poils incarnés, infection et complications imprévues qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années ou être permanentes.
- De nombreux tatouages cosmétiques et tatouages corporels sont réalisés avec des pigments d'oxyde de fer. L'oxyde de fer peut devenir rouge-brun ou noir. L'oxyde de titane et d'autres pigments peuvent également devenir noirs ou blancs.
- Parfois, il n'est pas possible d'enlever les encres noires ou blanches et le traitement doit être interrompu.

Des risques qui peuvent survenir immédiatement :

Les effets à court terme peuvent inclure :

- Rougeur, légère sensation de brûlure, ecchymoses ou cloques temporaires.
- La peau peut devenir brunâtre/rougeâtre (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation). Cela disparaît généralement en quelques semaines, mais la guérison peut prendre de 3 à 6 mois.
- Un changement de couleur permanent et une cicatrice sont des risques rares mais qui peuvent se produire. Une perte de taches de rousseur ou de lésions pigmentées peut se produire.
- Une perte de cheveux au niveau du site de traitement peut se produire et est transitoire.
- Des érosions superficielles, des ecchymoses, des cloques, de petits points blancs, des rougeurs et des gonflements sont observés chez certains patients et peuvent persister pendant des mois, des années ou de façon permanente.
- Saignement : les saignements ponctuels sont rares mais peuvent survenir après les procédures de traitement.

Réactions allergiques :

- Des cas d'hypersensibilité aux différents pigments du tatouage ont été signalés pendant et après le processus de suppression.
- Lorsqu'on utilise le laser sur le tatouage, on brise les encres en mille morceaux afin qu'elles puissent être éliminées par le corps. Dans certains cas, on peut réagir à la décomposition de ces encres, surtout si le pigment du tatouage contient du mercure, du cobalt ou du chrome.
- Lorsqu'ils sont disséminés, ces pigments peuvent provoquer une réaction allergique grave qui peut se manifester à chaque traitement successif.

Risque d'infection :

- Bien que les infections soient rares après le traitement, des infections bactériennes, fongiques et virales peuvent survenir. Des infections par le virus de l'herpès simplex autour de la bouche peuvent survenir après le traitement.
- Cela concerne à la fois les personnes ayant des antécédents d'infections par le virus de l'herpès simplex et celles n'ayant pas d'antécédents connus d'infections par le virus de l'herpès simplex dans la zone buccale.
- Si une infection cutanée survient, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires.

Je confirme également que, dès que je constate ces problèmes, je contacte immédiatement la clinique Sarasin.

Risques à long terme :

- Il existe un risque de cicatrisation, d'hyper- et d'hypopigmentation.
- Parfois, le médecin ou l'infirmière choisira de ne pas enlever complètement le tatouage si le risque de complications ci-dessus est trop élevé. Néanmoins, avec tout traitement, il existe un risque réel de troubles de l'hyper- et de l'hypopigmentation ainsi que de formation de cicatrices.
- Un changement de couleur et de texture de la peau peut se produire.

Postcure:

- Le respect des consignes de suivi est crucial pour la guérison, la prévention des cicatrices et l'hyperpigmentation.
- Il faut éviter le soleil pendant les deux mois qui suivent l'intervention.
- S'il est tout de même nécessaire de s'exposer au soleil, il faut utiliser un écran solaire avec un FPS 25 ou plus.
- Pendant la première semaine après le traitement, il ne faut pas aller au sauna/piscine et il est recommandé de prendre appliquer Flamigel deux fois par jour et le recouvrir d'un pansement occlusif.
- Des croûtes peuvent apparaître et ne doivent pas être enlevées.

Je comprends que plusieurs traitements seront nécessaires pour obtenir les résultats souhaités.

- Nous ne garantissons pas la disparition complète des tatouages.
- Nous nous réservons le droit d'interrompre le traitement à tout moment si nous avons des soupçons de non-respect du suivi. Ou lorsque les attentes du client ne sont pas réalistes.
- Nous ne pouvons pas donner une certitude à 100% sur les résultats qui peuvent être obtenus. L'élimination complète d'un tatouage n'est pas toujours possible, car les tatouages sont censés être permanents et dépendent en grande partie des encres choisies et de la profondeur à laquelle le tatouage a été réalisé..

CONFIRMATION

Mes questions sur la procédure ont reçu des réponses satisfaisantes. Je comprends la procédure et j'en accepte les risques. Par la présente, je dégage le prestataire de services de toute responsabilité en rapport avec la procédure susmentionnée.



VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS SUIVANTES :

Souffrez-vous ou avez-vous souffert de l'une des affections suivantes au cours des 12 derniers mois ?

Utilisez-vous des médicaments prescrits ?

Si oui, veuillez énumérer les médicaments utilisés.

	QUI	NON	MÉDICAMENTS UTILISÉS
Diabète	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hémophilie / tremblements / épilepsie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Grossesse / Allaitement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inflammation ou infection de la peau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Absence de sensation normale de la peau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Présente facilement des cicatrices	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dermatite de contact ou autre maladie de la peau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Souffrez-vous d'un problème cardiaque ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utilisez-vous un stimulateur cardiaque ou un dispositif similaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Allergie au latex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cold sore / Herpex Simplex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIH / SIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maladie auto-immune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Réaction à l'histamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Veuillez mentionner vos éventuelles allergies :

En cas de grossesse ou d'allaitement, nous n'effectuons pas de traitement.

Je confirme que les déclarations ci-dessus sont vraies.

Je m'engage à informer la clinique si l'une des informations ci-dessus change pendant les traitements.

nom + prénom patient

signature du patient

date



PERMANENT MAKEUP & TATTOO REMOVAL - INFORMED CONSENT

First name:	Last name:
Address:	Postal code:
Date of birth:	Telephone:
E-mail:	

PROBLEMS THAT CAN OCCUR DURING AND AFTER REMOVAL OF PMU, SPMU AND TATTOOS WITH THE LASER.

The potential risks of the procedure:

- Pain, purpura, swelling, redness, bruising, blistering, crusting, ingrown hairs, infection and unforeseen complications that can last for many months, years or permanently.
- Many cosmetic tattoos and body tattoos are made with iron oxide pigments. Iron oxide can turn reddish-brown or black. Titanium oxide and other pigments can also turn black or white.
- Sometimes the black or white inks cannot be removed and the treatment must be discontinued.

Risks that may occur immediately:

Short-term effects may include:

- Redness, a slight burning sensation, temporary bruising or blistering.
- The skin may become brownish/reddish (known as hyperpigmentation) or lighter (known as hypopigmentation). This usually disappears within a few weeks, but may take 3-6 months to heal.
- Permanent color change and scarring is a rare risk but can occur. Loss of freckles or pigmented lesions may occur.
- Hair loss at the treatment site may occur and is transient.
- In some patients, superficial erosions, bruising, blistering, small white dots, redness and swelling can be observed and may persist for months, years or permanently.
- Bleeding: spot bleeding is rare, but may occur after treatment procedures.

Allergic reactions:

- There have been reports of hypersensitivity to the various tattoo pigments during and after the removal process.
- When one lasers on the tattoo they break the inks into a thousand pieces so that they can be eliminated by the body. In a few cases, one can do a reaction to the breakdown of these inks, especially if the tattoo pigment contains mercury, cobalt or chromium.
- When spread, the pigments can cause a severe allergic reaction that can occur with each successive treatment.

Chance of Infection:

- Although infection is rare after treatment, bacterial, fungal and viral infections can occur. Herpes simplex virus infections around the mouth may occur after treatment.
- This applies to both individuals with a history of herpes simplex virus infections and those with no known history of herpes simplex virus infections in the oral area.
- If a skin infection occurs, additional treatments may be required.

I also hereby affirm that whenever I notice these issues I immediately contact Sarasin Clinic.

Long-term risks:

- There is a risk of scarring, hyper- and hypopigmentation.
- Sometimes the doctor or nurse will opt not to remove the tattoo completely if there is too great a risk of the above complications. Nevertheless, with any treatment, there is a real chance that one may experience hyper- and hypopigmentation disorders as well as scar formation.
- Color change and textural change in the skin may occur.

Aftercare:

- Compliance with aftercare guidelines is critical to healing, preventing scarring and hyperpigmentation.
- Aftercare guidelines include avoiding the sun for 2 months after surgery!
- If it is still necessary to go out in the sun, a sunscreen with SPF 25 or higher should be used.
- The first week after the treatment one should not go into the sauna / pool and it is recommended to apply Flamigel twice daily and cover with an occlusive dressing.
- Scabs may occur and must not be removed.

I understand that multiple treatments will be necessary to achieve the desired results.

- We do not guarantee complete removal of tattoos.
- We reserve the right to discontinue the treatment at any time when we have suspicions of improper compliance with aftercare. Or when the client's expectations are not realistic.
- We cannot give 100% certainty about the results that can be obtained. Complete tattoo removal is not always possible since tattoos were meant to be permanent and much also depends on the inks chosen and the depth in which the tattoo was set.

CONFIRMATION

My questions about the procedure have been answered to my satisfaction. I understand the procedure and accept the risks. I hereby release the service provider from all liability in connection with the above procedure.



PLEASE ANSWER ALL OF THE FOLLOWING QUESTIONS: Do you have or have you had any of the following conditions in the past 12 months? Are you using any prescription medications?

If yes, please list the medications used.

	YES	NO	MEDICINES USED
Diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hemophilia / tremors / Epilepsy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pregnancy / Breastfeeding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inflammation or infection of the skin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lack of normal skin sensation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gets scars easily	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contact dermatitis or other skin disease	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Are you suffering from a heart condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Do you use a pacemaker or similar device	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Latex allergy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cold sore / Herpex Simplex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
HIV / AIDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autoimmune Disease	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Histamine reaction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Please list any allergies you may have:

In case of pregnancy or lactation, we do not perform treatment.

I confirm that the above statements are true.

I promise to inform the clinic if any of the above information changes during treatments.

name + first name patient

signature patient

date

